

DATOS SOBRE LA MIFEPRISTONA Y EL MISOPROSTOL PARA EL ABORTO

AUTOGESTIONADO

Todos tienen el derecho a la información sobre cómo se usa el misoprostol para terminar un embarazo de manera segura y efectiva.



El aborto autogestionado con mifepristona y misoprostol es aproximadamente 95 por ciento efectivo en las primeras 10 semanas de embarazo. El protocolo de la Organización Mundial de la Salud para las personas que desean terminar su embarazo mediante mifepristona y misoprostol es usar una tableta de mifepristona (200 mg) y 4 tabletas de misoprostol (200 mcg cada una) durante dos días.

El protocolo se resume en los siguientes pasos:

1. Tragar una tableta de mifepristona (200 mg) con un vaso de agua. Comer y beber normalmente durante el resto del día.
2. 24 horas después, coloca cuatro tabletas de misoprostol (200 mcg cada una) en la mejilla entre la encía y los dientes inferiores, dos en cada lado. (Dos tabletas deben colocarse entre la encía y la mejilla en el lado izquierdo y dos tabletas entre la encía y la mejilla en el lado derecho.)
3. Permitir que las cuatro tabletas se disuelvan durante 30 minutos. No comer ni beber nada durante este tiempo. La saliva puede ser tragada. Tragar cualquier residuo del medicamento después de 30 minutos.



El tratamiento para las complicaciones del aborto autogestionado es exactamente el mismo que el tratamiento para las complicaciones de un aborto espontáneo o pérdida de embarazo. No hay ningún análisis que pueda detectar ni la mifepristona ni el misoprostol, y no hay motivo para que una persona informe a un proveedor médico que ha realizado su propio aborto autogestionado. Hasta la fecha, ha habido al menos 20 arrestos de mujeres que han terminado su embarazo fuera de un entorno médico en los Estados Unidos. Por lo tanto, una persona que busca atención médica no obtendrá ningún beneficio médico al informar a un proveedor que ha tomado cualquiera de los medicamentos, pero pueden estar poniéndose en riesgo legal.

Después de que alguien tome el medicamento, es normal sentir calambres intensos y sangrado durante varias horas. La mayoría del sangrado se detendrá para el día siguiente, pero es posible que un poco de sangrado leve continúe durante hasta 2 o 3 semanas. Los efectos secundarios comunes incluyen: náuseas, fiebre leve, escalofríos, dolores de cabeza y diarrea, que pueden ocurrir durante varias horas. Aunque poco comunes, pueden ocurrir complicaciones.

Los signos de complicaciones incluyen:



Sangrado abundante que dura más de dos horas y empapa más de dos toallas sanitarias por hora.



Dolor abdominal severo que no desaparece después de tomar antídolorífico o que continúa durante 2-3 días.



Fiebre de más de 102 grados Fahrenheit o fiebre de más de 100 grados Fahrenheit durante más de 24 horas.



Secreción vaginal de un color verde o amarillento inusual, y/o tiene un olor desagradable fuerte.

Los medicamentos para el aborto son mágicos. Involúcrate con Reproaction.
www.reproaction.org

Para obtener más información y el protocolo de la OMS sobre el aborto autogestionado utilizando solo misoprostol, consulte nuestras otras hojas informativas disponibles en nuestro sitio web.